



STIVORO

27% rookt

25% doet stoppoging

23 miljard verkochte sigaretten

19.000 sterfgevallen door roken

KERNCTJEERS ROKEN IN NEDERLAND

**Een overzicht van recente Nederlandse
basisgegevens over rookgedrag**

2010

Roken

Percentage rokers

27%

27% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Aantal rokers

3.720.184

3.720.184 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 3.634.113 tot 3.808.987 personen) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookten in 2010 wel eens (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage rokende jongeren

21%

21% van de Nederlandse jongeren van 10 tot en met 19 jaar had in 2010 in de afgelopen vier weken gerookt (bron: Roken Jeugd Monitor).

Aantal rokende jongeren

423.443

423.443 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 399.841 tot 447.046 personen) van de Nederlandse bevolking van 10 tot en met 19 jaar rookten in 2010 wel eens (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Roken Jeugd Monitor).

Aantal sigaretten per dag

14

Gemiddeld rookte de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die wel eens rookte in 2010 14 sigaretten en/of shagjes per dag (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage sigarettenrokers

18%

18% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens sigaretten (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage shagrokers

13%

13% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens shag (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage sigarenrokers

4%

4% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens sigaren of cigarillo's (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage hasj/weedrokers

4%

4% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens hasj/weed (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage waterpijprokers

3%

3% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens waterpijp (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage elektronische sigaretrokers

1%

1% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens een elektronische sigaret (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage pijpokers

1%

1% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder rookte in 2010 wel eens pijp (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten)

Percentage pruimtabakgebruikers

<1%

Minder dan 1% van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gebruikte in 2010 wel eens pruimtabak (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Stoppen

Stopratio (quit ratio)

56%

De stopratio of quit ratio is het percentage ex-rokers van de mensen die roken en die ooit gerookt hebben en was onder Nederlanders van 15 jaar en ouder in 2010 56% (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage dat stoppoging doet in een jaar

25%

25% van de (ex)rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder had in 2010 in het afgelopen jaar een stoppoging gedaan (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Aantal dat stoppoging doet in een jaar

944.183

944.183 personen (95% betrouwbaarheidsinterval van 901.401 tot 987.709 personen) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder zijn in 2010 gestopt met roken (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Succespercentage stoppogingen na een jaar

1-10%

1 tot 10% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die in 2009 een stoppoging had gedaan, had tot en met een jaar na de stoppoging (in 2010) geen enkele sigaret of shagje gerookt (bron: International Tobacco Control Netherlands Survey).

Percentage rokers ooit stoppoging gedaan

62%

62% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf in 2010 aan dat ze ooit een serieuze stoppoging hadden gedaan (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage rokende jongeren ooit stoppoging gedaan

44%

44% van de Nederlandse jongeren van 10 tot en met 19 jaar die in de afgelopen vier weken gerookt hebben, gaf in 2010 aan dat ze ooit een stoppoging hadden gedaan (bron: Roken Jeugd Monitor).

Gemiddeld aantal stoppogingen ooit gedaan door ex-rokers

2,4

De ex-rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaven in 2010 aan dat ze gemiddeld 2,4 stoppogingen hadden ondernomen in het verleden (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Gemiddeld aantal stoppogingen ooit gedaan door rokers

2,4

De rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaven in 2010 aan dat ze gemiddeld 2,4 stoppogingen hadden ondernomen in het verleden (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage hulpmiddelen gebruikt bij laatste stoppoging

34%

34% van de (ex)rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder die in 2010 aangaven in het afgelopen jaar een stoppoging te hebben gedaan, hebben daarbij een hulpmiddel of hulpmethode gebruikt (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Percentage van plan om te stoppen

80%

80% van de rokers in de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder gaf in 2010 aan van plan te zijn om in de toekomst te stoppen met roken (bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten).

Kopen

Aantal verkochte sigaretten

13.396 mlj 13.396 miljoen sigaretten zijn er in 2009 verkocht (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Aantal verkochte shagjes

9.647 mlj 9.647 miljoen shagjes zijn er in 2009 verkocht (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Prijs van een pakje sigaretten

€4,60 €4,60 was in 2010 de consumentenprijs van een pakje sigaretten van 19 stuks van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Prijs van een pakje shag

€5,50 €5,50 was in 2010 de consumentenprijs van een pakje shag van 47,5 gram van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Accijns per pakje sigaretten

€2,62 €2,62 was in 2010 de accijns op een pakje sigaretten van 19 stuks van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Accijns per pakje shag

€2,75 €2,75 was in 2010 de accijns op een pakje shag van 47,5 gram van de meest verkochte klasse (bron: Ministerie van Financiën).

Gezondheid

Op het moment van verschijnen van deze Kerncijfers komen de meest recente cijfers over gezondheid en roken uit 2008.

Hieronder staan de sterfgevallen door roken onder rokers. Er zijn geen recente cijfers uit Nederland beschikbaar over het aantal sterfgevallen door roken onder meerokers. Volgens een schatting van de Gezondheidsraad uit 2003¹ sterven er per jaar enkele honderden meerokers door longkanker en enkele duizenden door hartaandoeningen.

Totaal aantal sterfgevallen door roken

19.246 19.246 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2008 gestorven door een aan roken gerelateerde ziekte (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door longkanker ten gevolge van roken

8.443 8.443 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2008 gestorven door longkanker ten gevolge van roken (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door andere kankersoorten ten gevolge van roken

1.829 1.829 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2008 gestorven door andere kankersoorten ten gevolge van roken (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door astma en COPD ten gevolge van roken

4.850 4.850 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2008 gestorven door astma of COPD ten gevolge van roken (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

Aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten ten gevolge van roken

4.123 4.123 rokers van 20 jaar en ouder zijn in 2008 gestorven door hart- en vaatziekten ten gevolge van roken (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek bewerkt door het RIVM).

¹ Gezondheidsraad (2003). *Volksgezondheidsschade door passief roken*. Den Haag: Gezondheidsraad, publicatie nr. 2003/21.

Bronnen

Continu Onderzoek Rookgewoonten

Het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR) is een continu vragenlijstonderzoek dat via internet wordt uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. Wekelijks wordt er een landelijk gespreide steekproef van steeds andere personen uit TNS NIPObase ondervraagd. In 2010 zijn 26.689 Nederlanders gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek en hebben 18.768 Nederlanders (70%) daadwerkelijk deelgenomen. De resultaten van dit onderzoek zijn herwogen naar sekse, werkzaamheid, leeftijd, gezinsgrootte, opleiding, provincie en gemeentegrootte. Meer informatie: www.stivoro.nl/volwassenen/feitencijfers.

Roken Jeugd Monitor

De Roken Jeugd Monitor (RJM) is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek onder steeds andere jongeren van 10 tot en met 19 jaar. Dit onderzoek wordt door middel van persoonlijke interviews afgenomen door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. In 2010 hebben van 19 maart tot en met 29 april 4.629 jongeren deelgenomen aan het onderzoek. De enquêteurs hadden de instructie om de vraaggesprekken af te nemen buiten de aanwezigheid van leerkrachten, ouders en leerlingen. De onderzoeksresultaten zijn herwogen naar sekse, leeftijd, schooltype en provincie. Meer informatie: www.stivoro.nl/jongeren/feitencijfers.

International Tobacco Control Netherlands survey

Het Nederlandse gedeelte van het International Tobacco Control Policy Evaluation Project (het ITC onderzoek) is een jaarlijks terugkerend vragenlijstonderzoek onder dezelfde personen die in maart/april 2008 minstens maandelijks rookten, in hun leven minstens 100 sigaretten hadden gerookt, en 15 jaar of ouder waren. Het onderzoek wordt via internet uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van STIVORO. In 2010 hebben 1.275 van de 1.820 respondenten (70%) die in 2008 meededen weer meegedaan aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek zijn herwogen naar sekse, leeftijd en regio. Meer informatie: www.itcproject.org en www.stivoro.nl/lopendonderzoek.

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haalde het aantal personen in Nederland van 15 jaar en ouder in 2010 uit het bevolkingsregister. De totale verkoop van sigaretten in 2009 is berekend op basis van banderol afgifte gegevens van het Ministerie van Financiën. Het shagverbruik is berekend op basis van 1 gram tabak per gerolde sigaret. De CBS doodsoorzakenstatistiek is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland. De doodsoorzakenstatistiek wordt bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om inzicht te krijgen in de sterfgevallen door aan roken gerelateerde ziekten. Meer informatie: www.cbs.nl en www.rivm.nl/vtv.

Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën stelde de accijnzen op sigaretten en shag in 2010 vast in de Factsheet Belastingtarieven 2010. Meer informatie: www.minfin.nl/ejb2010.

Bronvermelding

© Overname met bronvermelding toegestaan. De correcte bronvermelding is: STIVORO – voor een rookvrije toekomst (2011). Kerncijfers roken in Nederland 2010. Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag. Den Haag: STIVORO – voor een rookvrije toekomst.

Samenstelling: G.E. Nagelhout

Datum: 21 januari 2011

Correspondentieadres: Postbus 16070, 2500 BB Den Haag

Kantooradres: Parkstraat 83 Den Haag

T 070 312 04 00

F 070 312 04 95

E info@stivoro.nl

I www.stivoro.nl

KvK Den Haag S200798

STIVORO – voor een rookvrije toekomst *is een initiatief van het Astma Fonds, de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding*



STIVORO

